

Pierre Tricot

Tableau d'acquisition des compétences sensibles et motrices pour l'enfant de 0 à 6 ans

	Structure cérébrale	Entrée en fonction	Compétence visuelle	Compétence Auditive	Compétence tactile	Mobilité	Langage	Compétence manuelle
VII	Néo-cortex	Précoce: 36 mois Moyenne: 72 mois Retardée: 144 mois	Lecture avec totale compréhension	Compréhension d'un lexique complet et de phrases correctes	Identification tactile des objets	Utiliser la jambe de façon permanente avec l'hémisphère dominant	Lexique complet et structure de syntaxe correcte	Latéralité manuelle dans l'écriture
VI	Cortex transitionnel	Précoce : 18 mois Moyenne: 36 mois Retardée: 72 mois	Identification de symboles visuels et des lettres dans la limite de l'expérience	Compréhension de 2000 mots et phrases courtes	Identification des objets par le toucher	Marcher et courir avec complète contro-latéralité (bras/jambe opposés)	2000 mots de langage et phrases courtes	Ambidextre avec une main dominante
V	Paléo-cortex	Précoce : 9 mois Moyenne: 18 mois Retardée : 36 mois	Différenciation de symboles simples similaires et non identiques	Compréhension de 10 à 25 mots et de couplages de mots	Différenciation tactile d'objets similaires et non identiques	Marcher avec les bras libérés du rôle de balance primaire	10 à 25 mots et mots coupés	Opposition corticale bilatérale et simultanée
IV	Archi-cortex	Précoce: 6 mois Moyenne: 12 mois Retardée : 24 mois	Vision binoculaire convergente	Compréhension de 2 mots	Discrimination tactile d'une troisième dimension d'objets semblant plats	Marcher avec bras employés dans un rôle d'équilibre primaire (balancier)	2 mots de conversation employés de façon significative et spontanée	Opposition corticale d'une main ou de l'autre
III	Mésencéphale	Précoce: 3,5 mois Moyenne : 12 mois Retardée : 24 mois	Appréciation des détails au sein d'une configuration	Appréciation de sons significatifs	Appréciation de sensations gnosiques	Marche à quatre pattes controlatéral	Création de sons significatifs	Attraper et serrer dans la main
II	Pont de Varole	Précoce : 1 mois Moyenne: 2,5 mois Retardée : 5 mois	Perception de contours agressifs	Réponse vitale aux bruits	Perception de sensations vitales	Faire du plat-ventre et plat-ventre controlatéral	Pleurs réflexes de survie	Relâchement vital
I	Moelle allongée ou épinière	Précoce naissance: 15 jours Moyenne naissance: 1 mois Retardée naissance : 2 mois	Réflexe pupillaire	Réflexe de sursaut	Réflexe plantaire	Mouvements des bras et des jambes	Cri du nouveau-né et pleurs	Réflexe d'agrippement

Reproduit avec l'autorisation de la rédaction de la revue Énergie Santé